

Pomme de Terr

Ministère de l'Agriculture Service Régional de la Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue 518, rue St Fuscien BP 69 20092 AMIENS CEDEX 3 Cél: 03.22.33.55.97 Fax: 03.22.33.55.56 E-mail: srpv.drafpicardie@agriculture.gouv.fr Notre site: www.srpvpicardie.com

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles d'AMIENS Directeur gérant : Christophe MARTINET Publication périodique C.P.P.A.P n°1823AD GSSN n°07576609

Farif Courrier 360 F Farif Fax 360 F Farif E-mail 360 F

0







POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 14 du 15 juillet 2002 - 01 page

Phénologie

Stade: Pleine floraison à fin floraison.

Mildiou

Le coin des modèles

Comme énoncé dans le dernier Bulletin, la présence de la pluie en début de semaine dernière a donné lieu à des sorties de taches. Il convenait de protéger vos parcelles avant le passage pluvieux.

Dans le même temps, de nouvelles contaminations ont été enregistrées les 10-13 et 14 juillet donnant naissance à une nouvelle génération sur l'ensemble de la Picardie.

Le modèle Milsol nous indique des indices de sporulation toujours élevés.

Studionépidénidajqeposteparposte (daprès Gritz-Divax)

Postes dimatiques	Génération	Date der. Contominations	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation	n
Aniens (Boves)	8ène	10:14/7	àpartir du 17	fart	•
Attily	9ème	10-13-14/07	àpartir du 17	fart	
Booleau	8ène	10-14/07	àportin du 17	f a1	P
Forté	8ène	10:13:14/07	àpartir du 17	fart	
Freichart	9ène	9101407	àpartir du 16	fart	7
Ind	8ène	9-10-12-13/7	àpartir du 16	fart	1
Maraelaawe	Same	1013147	àpartir du 17	fat	1
3 Just	8ène	10-11-13-14/7	àpartir du 17	fart	P
Vauvillers	9ène	9au14	àpartir du 16	fart	
Verdily	8ène	10-13-14/7	àportir du 17	fart	
Vicsur Aisne	7êne	10-13/7	àpartir du 17	fart	
Villeroy	Phe technique	3			
Villiers le Sec	9ène	10-13-14/7	àportindu 17	fart	
Villers Booge	9ène	10:13-14	àpartindu17	fart	-

Appui à l'interprétation du modèle

Le potentiel de sporulation reste encore élevé. Par conséquent, il n'est pas envisageable de décaler le renouvellement du traitement pour les variétés intermédiaires et sensibles.

Préconisations pour les parcelles que l'on veut maintenir en végétation

TOUTES VARIETES

Poursuivez un renouvellement à 7 jours avec un dithiocarbamate à 1600 g de m.a.

Préconisations pour les parcelles où la date de défanage est proche

TOUTES VARIETES

Dans le cas où des symptômes de mildiou ont été observés, préférez l'emploi des produits type fluazinam (SHIRLAN) ou cyazofamide (RANMAN). Ces produits permettent de minimiser les attaques de mildiou sur tubercules. Un re nouvellement à 7 jours est conseillé.

 Dans le cas contraire, maintenez une protection avec un mancozèbe.

Prenez, garde à la sensibilité mildiou sur variétés résistantes. Dans certains cas, une variété résistante en mildiou de feuillage peut être sensible sur tubercules. Mildiou La pluie relance les risques

Pucerons
Aucune
intervention ne se
justifie

Prévisions climatiques

Absence de pluie, remontée des températures et présence de nombreux nuages sont au menu de cette semaine.

4º 2000 - 9699



